

Informacja dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy

Rozprzestrzenianiu się zakażenia sprzyjają duże skupiska ludzkie. Wszawicą można zarazić się tylko przez bezpośredni kontakt, dlatego zaleca się, aby:

- profilaktyczna kontrola włosów dzieci stała się nawykiem rodziców,
- domownicy nie korzystali wspólnie z rzeczy osobistego użytku takich jak: grzebień lub szczotka, gumki do włosów, czapki, szaliki,
- codziennie czesać i szczotkować włosy dziecka, długie związywać,
- uczulić dziecko aby nie pożyczało grzebienia, szczotki, ozdób do włosów, czapki, szalika od kolegów (np. na koloniach, obozach)
- unikać bezpośredniego stykania się z głowami (włosami) z innymi ludźmi.

Jak rozpoznać wszy u dziecka ?

Charakterystycznym objawem wszawicy jest świąd. Gdy dziecko drapie się po głowie, należy niezwłocznie skontrolować skórę głowy i włosy.

Gnidy (jaja wszy) występują u nasady włosów, zwłaszcza za uszami, z tyłu głowy tuż nad karkiem i w okolicy skroni.

Jeśli stwierdzi się że dziecko ma wszawicę, należy niezwłocznie przejrzeć głowy pozostałych domowników. Leczeniem należy objąć wszystkich domowników. Odzież osoby chorej, bielizną, pościel, należy wyprać i wyprasować. Szczotki, grzebienie, ozdoby noszone we włosach, albo wyrzucić, albo starannie wymoczyć preparacie wszobójczym. W leczeniu wszawicy stosuje się preparaty w postaci szamponów, kremów, lub żelu, dostępnych w aptece bez recepty.

W przypadku wystąpienia wszy u dziecka, należy poinformować o tym wychowawcę lub pielęgniarkę szkolną.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza lub pielęgniarki szkolnej.